



什麼是壞死性腸炎？

壞死性腸炎 (necrotizing enterocolitis, 發音為 [neck-ro-tie-zing en-tear-oh-ko-lie-tis]) 這個字，又稱 NEC，描述一種腸道的疾病。

在罹患 NEC 的情況下，腸道內襯有一部分破損，會影響嬰兒消化系統處理食物的能力。

什麼會導致 NEC？

NEC 成因未知。NEC 最常見於早產嬰兒和／或已經生病的嬰兒。其他可能風險因子可能包括：

- 低出生體重
- **絨毛膜炎** (胎盤和圍繞嬰兒周圍的液體感染，最常發生於從母親羊水破了到嬰兒出生的時間較長時。)
- 出生期間氧含量低下
- **先天性心臟疾病**。先天性代表出生時就已存在。
- **血液交換輸血**


NEC 有什麼症狀？

NEC 症狀可能緩慢或很快地出現，其中包括：

- 腹脹
- 腹瀉
- 低活動力
- 嘔吐
- 糞便中有血
- 對於進食缺乏或不感興趣
- 體溫異常 (可能太低或太高)

NEC 會危及生命嗎？

NEC 是嚴重的疾病，且可危及生命。提早積極治療有助於改善存活機會。



治療壞死性腸炎

我的嬰兒將接受什麼樣的治療？

懷疑或診斷嬰兒罹患 NEC 時：

- 停止口服餵哺
- 將管子插入嬰兒胃部，以舒緩氣體壓力
- 靜脈內（透過靜脈）輸液
- 給予**抗生素**

我將如何得知我的嬰兒情況如何？

新生兒加護病房 (NICU) 團隊將讓您得知您嬰兒健康的即時進展。首先，罹患 NEC 的嬰兒會接受 X 光和血液檢測，每天數次。隨著嬰兒症狀改善，這些檢測頻率可能降低。

我的嬰兒將需要接受手術嗎？

有些罹患 NEC 的嬰兒將需要接受手術。如有下列情況，就可能要動手術：

- 腸道有很多損傷
- 腸壁有孔洞或裂開（**穿孔**）
- 如果嬰兒罹患**腹膜炎**（腹腔內壁發炎）
- 如果嬰兒接受非手術治療後沒有改善

接下來會發生的事？

許多嬰兒對於 NEC 治療反應良好；然而每位嬰兒都是不同的。請與您嬰兒的醫護團隊討論，他們可以解答任何您有關您的嬰兒的疑問。

詞彙表

抗生素 – 對抗細菌引起感染的藥物

絨毛膜炎 (chorioamnionitis, 發音為 [kor-e-o-am-nee-o-ni-tis]) – 胎盤和圍繞嬰兒周圍的液體感染

血液交換輸血 – 緩慢移除嬰兒體內血液，並以新鮮捐贈者血液替換的過程

腸子 – 常用於描述大腸和小腸的詞

先天性 – 出生時就已存在

壞死性腸炎 – 腸道的發炎

壞死 – 導致組織破損

腹膜炎 – 腹壁發炎

穿孔 – 孔洞或裂開

如果您有疑問，請詢問醫護團隊，他們都很樂意協助您。

請造訪 www.nicu-pet.com，
下載額外副本。

附註：
