



¿Qué es el síndrome de abstinencia neonatal?

El síndrome de **abstinencia neonatal** (*neonatal abstinence syndrome, NAS*) afecta a los bebés que, antes de nacer, estuvieron expuestos a fármacos o drogas que pueden producir adicción tales como:

- Fármacos de venta con receta (por ejemplo, oxicodona para el dolor crónico, metadona)
- Drogas ilícitas (por ejemplo, cocaína/*crack*, heroína, metanfetamina cristalina)

El bebé se hace adicto a estas sustancias cuando todavía está en el vientre materno. Después de nacer, el bebé pasa por un proceso de **privación**. Esos síntomas caracterizan el NAS.


¿Cuáles son los síntomas del NAS?

Los síntomas dependen de muchos factores, tales como, entre otros:

- El tipo de fármaco o droga que se usó
- Cuán a menudo (y por cuánto tiempo) se usó el fármaco o droga
- Cuánto fármaco o droga se usó
- Si el bebé nació antes de tiempo (prematuramente)

La mayoría de los síntomas del NAS aparecen unos pocos días después del nacimiento, y comprenden:

- Llanto excesivo y/o irritabilidad
- Llanto agudo
- Mala alimentación
- Fiebre y/o sudoración
- Respiración rápida
- Coloración en manchas de la piel (moteado)
- Diarrea y/o vómitos
- Reflejos hiperactivos
- Dificultad para dormir
- Nariz tapada, estornudos
- Convulsiones o temblores



El síndrome de abstinencia neonatal surge a causa de la privación de un fármaco o droga. Los síntomas pueden afectar muchas partes del cuerpo, como el sistema nervioso, el aparato digestivo, los pulmones y los músculos.

